

# Notiz über einige Germar'sche Typen

von

E. v. Harold in München.

In der Sammlung des Herrn Dr. Kraatz befindet sich zur Zeit ein Theil der Original-Exemplare zu jenen Beschreibungen, welche Germar im Mag. Entomol. I. 1813 und in seinen Ins. Spec. nov. 1824 gegeben hat. Da einige dieser Arten bisher zweifelhaft geblieben sind, andere in der Zwischenzeit nochmals beschrieben wurden, so gebe ich im Nachstehenden, hierbei auf die coprophagen Lamellicornien mich beschränkend, ein berichtigendes Verzeichniß derselben.

1. *Copris gracilicornis* Germ. Mag. Ent. I. p. 114. ist *Onthophagus spinifex* Fabr., eine durch langes, fadenförmiges Kopfhorn ausgezeichnete ostindische Art.
2. *Copris analis* l. c. p. 115. Ist ein *Onthophagus*.
3. *Ateuchus humeralis* l. c. p. 116. Ist ein *Canthidium*, welches mir bei Bearbeitung dieser Gattung (Coleopt. Heft I.) unbekannt geblieben ist und bei Benutzung der dort gegebenen synoptischen Tabelle neben *C. puncticolle* sich stellen würde.
4. *Ateuchus lituratus* p. 117. Ist ein im südlichen Amerika weit verbreiteter, sehr variabler *Canthon*.
5. *Ateuchus bispinus* Germ. Ins. spec. nov. p. 97. Ein *Canthon*.
6. *A. probus* l. c. p. 98. Ein *Canthon*, zu dem *C. praticola* Lec. Col. Kans. 1859 p. 10. gehört.
7. *A. cinctellus* l. c. p. 98. Ein *Canthon*, sehr verbreitet in den Sammlungen als *C. fasciatus* Dej. und *transversus* Klug.
8. *A. vividus* l. c. p. 99. Ein *Choeridium*.
9. *Copris inhiata* sowie die folgenden *C. crinicollis*, *bicuspis*, *semiaenea* und *semicuprea* sind ächte *Copris*-Arten, sämmtliche zu *Pinotus* Er. gehörend.
14. *Copris pauperata* l. c. p. 103. Ein ächtes *Choeridium*.
15. *Copris brevis* l. c. p. 103. Ist *Canthidium lugubre* Har. Col. Heft I. p. 39.
16. *Copris ruficollis* p. 104. Ist *Canthidium ruficolle* Germ., wozu als Synonym der *Onthophagus cruentus* Perty Del. anim. p. 42. t. 9. f. 1. gehört.